

# FACTSHEET



نشرة المعلومات هذه هي لغرض التوعية فقط. يرجى استشارة طبيبك أو اختصاصيين صحيين آخرين للتأكد من ملاءمة هذه المعلومات لطفلك. وإذا رغبت بتقديم رأي أو تعليق عن هذه النشرة يرجى تفقد الموقع:

<https://www.schn.health.nsw.gov.au/fact-sheets/feedback-form>

## مرض التهاب المكورات العنقودية من المجموعة A الغزوية - نشرة معلومات

كما يمكن أن تسبب مرض نخر اللحم (necrotising fasciitis) أو فشل متعدد الأعضاء (متلازمة الصدمة السمية) لدى عدد ضئيل من الأطفال. ويتراوح معدل الوفيات لدى الأطفال الذين يصابون بـiGAS بين ٢٪ إلى ٨٪، مع إعاقة طويلة الأجل تؤثر على ٣٪ إلى ٨٪ من الأطفال.

### العلامات والأعراض

تختلف العلامات والأعراض بحسب عضو الجسم المصاب بالعدوى. وعليك أخذ طفلك إلى الطبيب بأسرع وقت بعدما تلاحظ تزايد أية أعراض شديدة أو متوسطة الحدة لديه.

قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

- ارتفاع بالحرارة
- قشعريرة و/أو تعرق
- تقرحات جلدية حمراء اللون أو ساخنة أو مؤلمة سريعة الانتشار - قد تظهر عليها تقشرات أو تنزق قيحاً
- طفح جلدي أحمر اللون يشبه حروق الشمس (طفح الحمى القرمزية)
- دوخة أو الشعور بحالة إغماء
- وجع بالرأس و/أو تيبس بالرقبة
- التهاب بالحلق
- ضيق في التنفس و/أو وجع بالصدر
- غثيان، تقيؤ، وجع بالبطن
- إرهاق (تعب)
- وجع بالعضلات وألم عند الضغط عليها

يمكن أن يسبب التهاب المكورات العنقودية من المجموعة A الغزوية (iGAS) عدداً من الأمراض تتراوح حدتها بين المتوسطة والخطيرة لدى الأطفال. وتسمى الجرثومة المسؤولة عن التسبب بهذا المرض "العنقودية المقيحة" (المعروفة بـ Strep A).

### المقدمة

تنتشر عدوى Strep A من شخص مصاب بها إلى شخص آخر بقطرات الرذاذ عن طريق:

- العطس
- السعال
- التقبيل
- المخالطة المباشرة (ملامسة جلد شخص مصاب بعدوى Strep A)
- يحمل بعض الأشخاص بكتيريا Strep A في حلقهم أو على جلدهم من دون ظهور أعراض لديهم، لكن يمكن أن ينقلوا العدوى إلى الآخرين.
- قد يتعرض الأطفال إلى عدوى Strep A الحلقية أو تقرحات جلدية (القوباء). إذا تم اكتشاف العدوى ومعالجتها مبكراً، يمكن تجنب حصول التهاب شديد ومضاعفات.
- وإذا لم تُعالج، قد يعاني عدد ضئيل من الأطفال من الحمى الروماتيزمية التي يمكن أن تسبب:
- وجعاً والتهاباً في المفاصل
- مشاكل في صمامات القلب (مرض القلب الروماتزمي)
- ويمكن أن تسبب عدوى Strep A مرضاً شديداً أو غزواً (iGAS) عبر انتشار المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل:
- مجرى الدم (إنتان/تجرثم الدم)
- الرئتان (إلتهاب الرئة)
- العظم (التهاب النقي أي نخاع العظم)
- المفاصل (التهاب المفاصل الإنتاني)
- القلب (التهاب غلاف القلب)



The Sydney  
children's  
Hospitals Network

care, advocacy, research, education

## التشخيص

يمكن أن تتفاقم حدة مرض الطفل المصاب بعدوى Strep A جداً خلال ١٢ إلى ٢٤ ساعة.

لتحديد إصابة الطفل بـ Strep A بدقة، يحتاج الطبيب إلى فحصه وقد يأخذ عينة من دم الطفل وعينات أخرى من الجلد أو الحلق على سبيل المثال، ثم يُرسل العينات إلى المختبر للفحص وتحديد نوع البكتيريا.

## العلاجات

تُعالج عدوى Strep A عادةً بالمضادات الحيوية.

وسوف تحتاج إلى عزل طفلك لحين إكماله اليوم الأول من العلاج لمنع انتشار العدوى إلى الآخرين. وعموماً، يمكن أن يساعد إبقاء الأطفال بعيداً عن الآخرين لحين تحسّن صحتهم على خفض انتشار العدوى في المجتمع.

وفي حالات العدوى الشديدة يحتاج الطفل إلى إدخاله إلى المستشفى لتلقي العناية ومراقبة حالته. وقد يُنصح أيضاً والدا الطفل أو مقدمي الرعاية له أو سكان المنزل الآخرون المخالطون له بأخذ مضادات حيوية في هذه الحالة.

## أسئلة يكثر طرحها

من هم المعرضون للخطر؟

الأشخاص الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بعدوى Strep A أو مضاعفاتها بعد الإصابة بها هم:

- الرضع والأطفال الصغار خاصةً الرضع تحت السنة من العمر
- المواليد الجدد لأمهات مصابات بعدوى Strep A العزويّة
- الأطفال الذين أصيبوا مؤخراً بصدمة أو حروق أو أجروا عملية جراحية
- الأطفال الذين أصيبوا مؤخراً بعدوى الفيروس النطاقي الحُمَاقِي (جدري الماء)
- الأطفال الذي أصيبوا مؤخراً بالإنفلونزا
- الأطفال الذين لديهم عجز في المناعة (يتداونون بالأستيرويدات أو العلاج الكيميائي)
- الأطفال الأبوريجينيين و/أو أطفال سكان جزر مضيق توريس
- أفراد العائلة أو سكان المنزل المخالطون لشخص مصاب بعدوى Strep A العزويّة

## كيف يمكن منع الإصابة بعدوى Strep A؟

يمكن منع الإصابة بعدوى Strep A كما يلي:

- غسل اليدين تكررًا بالماء والصابون
- الحفاظ على نظافة الجروح وتغطيتها لحين شفائها
- الحصول على نصيحة طبية وعلاج طبي إذا أصبت أنت أو طفلك بالمرض وكنت قد خالطت أنت أو هو شخصاً مصاباً بعدوى Strep A في الـ ٣٠ يوماً الماضية.
- الحصول على نصيحة طبية وعلاج طبي إذا أصبت أنت أو طفلك بالتهاب في الحلق أو تقرّحات جلدية، وعلى الأخص بالنسبة للأبوريجينيين وأبناء مضيق جزر توريس.
- قد يساعد أخذ جميع اللقاحات المطلوبة لجدري الماء والإنفلونزا على خفض خطر الإصابة بعدوى Strep A

## هل يوجد لقاح؟

لا يوجد حالياً لقاح يمنع الإصابة بعدوى Strep A، لكن تُجرى بحوث متواصلة لاكتشاف لقاح لها.

## موارد ومزيد من المعلومات

Invasive group A streptococcal (iGAS) disease – Communicable Diseases Factsheet. NSW Health.

<https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Invasive-group-A-streptococcus.aspx>

Safety Alert 001/23. Clinician Alert – Invasive group A streptococcal disease.

<https://www.health.nsw.gov.au/sabs/Documents/2023-sa-001.pdf>

Invasive group A streptococcal disease – NSW Control Guidelines for Public Health Units. NSW Health

<https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/controlguideline/Pages/invasive-group-a-strep.aspx>

Invasive group A streptococcal infections in children.

<https://www.uptodate.com.acs.hcn.com.au/contents/invasive-group-a-streptococcal-infections-in-children>

Murdoch children's research institute. Streptococcus A.

<https://www.mcri.edu.au/impact/a-z-child-adolescent-health/s/streptococcus-a>